

UTILISATION DES ENZYMES DE RESTRICTION ET POLYMORPHISME GENIQUE

Fiche sujet - candidat

Les enzymes de restriction coupent les séquences d'ADN en des sites composés de quelques bases et qui leur sont spécifiques, appelés sites de restriction. Certaines formes de rétinites pigmentaires (destruction progressive des cellules visuelles qui conduit à la cécité) sont dues à des formes anormales d'un pigment visuel protéique : la rhodopsine. L'allèle muté est dominant dans la plupart des cas étudiés.

On cherche à trouver des enzymes de restriction permettant le repérage des allèles responsables de la maladie.

Matériel :		
<ul style="list-style-type: none"> – logiciel ANAGENE et sa fiche technique – séquences alléliques du gène codant pour la rhodopsine (pigment rétinien), disponibles en fichier ANAGENE « RHODO.EDI » dans le répertoire « Sauve » – fichier d'une sélection d'enzymes de restriction « ENZRHO.ZYM » 		
Activités et déroulement des activités	Capacités	Barème
1- Sachant que chaque enzyme de restriction est spécifique d'une séquence particulière de l'ADN (site de restriction), justifier l'utilisation des enzymes de restriction, puis d'une électrophorèse pour dépister un allèle muté.	Comprendre la manipulation	2
2- Ouvrir avec ANAGENE, le fichier RHODO.EDI puis utiliser les fonctionnalités du logiciel pour comparer l'allèle fonctionnel de la rhodopsine (rhonorm) aux autres allèles. Noter précisément (sur la fiche réponse candidat) la ou les différences et leurs emplacements.	Utiliser un logiciel de traitement de données	6
3- Traiter les allèles du gène par l'action des enzymes de restriction disponibles dans le fichier « ENZRHO.ZYM » pour obtenir la carte des sites de restriction et le tableau de comparaison (choisir un affichage mosaïque). Appeler l'examineur pour vérification		
4- Choisir une enzyme qui permette de distinguer l'allèle fonctionnel (rhonorm) d'un des allèles mutés et justifier votre choix sur la fiche réponse candidat. Appeler l'examineur pour vérification du choix de l'enzyme	Appliquer une démarche explicative	2
5- Identifier et localiser la mutation à l'origine de la différence du nombre de sites de restriction. Mettre en évidence cette mutation en utilisant le curseur dans la fenêtre « affichage des séquences ». Appeler l'examineur pour vérification	Utiliser un logiciel de traitement de données	3
6- Schématiser les cartes de restriction obtenues pour l'allèle fonctionnel et l'allèle choisi avec le ou les sites d'action de l'enzyme sélectionnée. Compléter ce schéma en reportant la mutation à l'origine de la différence du nombre de sites de restriction.	Traduire des informations par un schéma	4
7- A partir des informations présentées dans votre schéma, expliquer en quoi l'enzyme de restriction sélectionnée permet le dépistage de la rétinite pigmentaire.	Appliquer une démarche explicative	3